

# Informativa riguardo al farmaco Wegovy

## Modalità di utilizzo

Il farmaco prevede una somministrazione settimanale (una sola volta alla settimana) **sottocute** con ago sterile **usa e getta**. L'orario di somministrazione è indifferente ma è indicato mantenere regolarità nel giorno della settimana scelto per la somministrazione (ad esempio, sempre di domenica).

Se necessario, è possibile modificare il giorno dell'iniezione settimanale di questo medicinale purché siano trascorsi almeno 3 giorni dall'ultima iniezione del medicinale. Una volta scelto un nuovo giorno di assunzione, continui con la somministrazione una volta alla settimana.

Prima dell'apertura conservare in frigorifero (2 °C – 8 °C). Non congelare Wegovy e non utilizzarlo se è stato congelato. Conservare lontano dagli elementi refrigeranti. Proteggere il medicinale dalla luce.


Durante l'utilizzo:

- è possibile conservare la penna per 6 settimane, se conservata a una temperatura inferiore a 30 °C o in un frigorifero (2 °C – 8 °C) lontano dagli elementi refrigeranti.
- quando non si utilizza la penna, tenere il cappuccio della penna inserito per proteggerla dalla luce.

## Dosaggio

È necessario impostare il dosaggio corretto prima di pungere, girando la rotellina che si trova sul fondo della penna.

Il <b>dosaggio</b> settimanale, per le settimane da 1 a 4, è di	<b>0,25 mg alla settimana.</b>
Il <b>dosaggio</b> settimanale, per le settimane da 5 a 8, è di	<b>0,5 mg alla settimana.</b>
Il <b>dosaggio</b> settimanale, per le settimane da 9 a 12, è di	<b>1,0 mg alla settimana.</b>
Il <b>dosaggio</b> settimanale, per le settimane da 13 a 16, è di	<b>1,7 mg alla settimana.</b>
Il <b>dosaggio</b> settimanale, dalla settimana 17, è di	<b>2,4 mg alla settimana.</b>



La penna dev'essere verticale rispetto alla pelle (i punti migliori per praticare l'iniezione sono la parte anteriore della parte superiore del braccio, la parte superiore delle gambe o l'addome.) e il tasto di infusione dev'essere mantenuto schiacciato per circa 6 secondi in modo da dare tempo al farmaco di liberarsi (non deve però premere la penna sulla cute).

Se dimentica di iniettare una dose e:

- sono trascorsi 5 giorni o meno da quando avrebbe dovuto usare Wegovy, lo inietti appena se ne ricorda. Quindi inietti la dose successiva come fa abitualmente nel giorno programmato.
- sono trascorsi più di 5 giorni da quando avrebbe dovuto usare Wegovy, ignori la dose saltata.

Quindi inietti la dose successiva come fa abitualmente nel giorno successivo programmato. Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

### *Monitoraggio possibili effetti avversi*

**Molto comuni** (possono interessare più di 1 persona su 10):

mal di testa, nausea, vomito, diarrea, stitichezza, dolore di stomaco, stanchezza o debolezza.

Questi effetti indesiderati vengono osservati principalmente durante l'aumento della dose e generalmente scompaiono nel tempo.

**Comuni** (possono interessare fino a 1 persona su 10):

capogiri, dolore di stomaco o indigestione, eruttamento, gas intestinali (flatulenza), gonfiore di stomaco, infiammazione dello stomaco (gastrite: i segni includono dolore allo stomaco, nausea e vomito), reflusso o bruciore di stomaco (chiamato anche "malattia da reflusso gastroesofageo"), calcoli biliari, perdita di capelli, reazioni nel sito di iniezione, alterazione del gusto di cibi o bevande, bassi livelli di zucchero nel sangue (ipoglicemia) in pazienti con diabete di tipo 2.

**Non comuni** (possono interessare fino a 1 persona su 100):

pressione sanguigna bassa, sensazione di vertigini o stordimento alzandosi in piedi o sedendosi a causa di un calo della pressione sanguigna, battito cardiaco accelerato, aumento degli enzimi pancreatici (come lipasi e amilasi) riscontrato negli esami del sangue, ritardo nello svuotamento dello stomaco.

Legga il foglietto illustrativo presente nella confezione del farmaco prima dell'utilizzo e chiedi al suo medico in caso di dubbi, e segnali prontamente al medico l'eventuale comparsa di effetti collaterali.