Informativa riguardo al farmaco Mounjaro

Modalità di utilizzo

Il farmaco prevede una somministrazione settimanale (una sola volta alla settimana) **sottocute** con ago sterile **usa e getta**. L'orario di somministrazione è indifferente ma è indicato mantenere regolarità nel giorno della settimana scelto per la somministrazione (ad esempio, sempre di domenica).
Il giorno di somministrazione settimanale può essere modificato, se necessario, purché l'intervallo tra le due somministrazioni sia di almeno 3 giorni.

Prima dell'apertura conservare in frigorifero (2 °C – 8 °C). Non congelare Mounjaro e non utilizzarlo se è stato congelato. Conservare lontano dagli elementi refrigeranti. Proteggere il medicinale dalla luce. Può essere conservato fuori dal frigorifero ad una temperatura inferiore a 30 °C fino a un massimo di 30 giorni.

Dosaggio

La dose iniziale di Mounjaro è 2,5 mg una volta a settimana. Dopo 4 settimane, la dose deve essere aumentata a 5 mg una volta a settimana. Se necessario, è possibile aumentare la dose con incrementi di 2,5 mg dopo un minimo di 4 settimane con la dose in uso.
Le dosi di mantenimento raccomandate sono 5 mg, 10 mg e 15 mg.
La dose massima è 15 mg una volta a settimana. È necessario impostare il dosaggio corretto prima di pungere, girando la rotellina che si trova sul fondo della penna.

Il **dosaggio** settimanale, per le settimane da 1 a 4, è di **2,5 mg alla settimana**.
Il **dosaggio** settimanale, per le settimane da 5 a 8, è di **5 mg alla settimana**.
Il **dosaggio** settimanale, per le settimane da 9 a 12, è di **7,5 mg alla settimana**.
Il **dosaggio** settimanale, per le settimane da 13 a 16, è di **10 mg alla settimana**.
Il **dosaggio** settimanale, per le settimane da 17 a 20, è di **12,5 mg alla settimana**.
Il **dosaggio** settimanale, dalla settimana 21, è di **15 mg alla settimana**.



La penna dev'essere verticale rispetto alla pelle. Mounjaro viene iniettato sotto la cute (iniezione sottocutanea) della zona della pancia (addome) ad almeno 5 cm dall'ombelico o della parte superiore della gamba (coscia) o della parte superiore del braccio. Potrebbe aver bisogno dell'aiuto di qualcun altro, se vuole fare l'iniezione nella parte superiore del braccio.
Il tasto di infusione dev'essere mantenuto schiacciato per circa 5 secondi in modo da dare tempo al farmaco di liberarsi (non deve però premere la penna sulla cute).

Se desidera, è possibile utilizzare la stessa zona del corpo ogni settimana, ma si assicuri di scegliere un sito di iniezione diverso all'interno di quell'area.

Se viene dimenticata una dose, deve essere somministrata il prima possibile entro 4 giorni dalla dose dimenticata. Se sono trascorsi più di 4 giorni, saltare la dose dimenticata e somministrare la dose successiva nel giorno regolarmente programmato. In ogni caso, i pazienti possono poi riprendere la loro regolare programmazione una volta a settimana

Monitoraggio possibili effetti avversi

Molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):
nausea, diarrea.

Questi effetti indesiderati vengono osservati principalmente durante l'aumento della dose e generalmente scompaiono nel tempo.

Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):
capogiri, ipotensione, dolore addominale, vomito, dispepsia, stipsi, distensione addominale, eruttazione, flatulenza, malattia da reflusso gastroesofageo, perdita di capelli, stanchezza, frequenza cardiaca aumentata, lipasi aumentata, amilasi aumentata, reazioni nel sito di iniezione.

Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):
colelitiasi, colecistite, pancreatite acuta, calcitonina ematica aumentata.

Rari (meno di 1 persona su 100 e fino a 1 persona su 1000):
anafilassi, angioedema.

Ipoglicemia può presentarsi se Mounjaro è utilizzato con altri farmaci per la cura del diabete (se sta usando Mounjaro con una sulfonilurea o insulina, è importante che controlli i livelli di glucosio nel sangue).

Legga il foglietto illustrativo presente nella confezione del farmaco prima dell'utilizzo e chieda al suo medico in caso di dubbi, e segnali prontamente al medico l'eventuale comparsa di effetti collaterali. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione.